



Poster N°: P1032

## Titre : Relation entre connaissances, attitudes et pratiques des professionnels de santé vis-à-vis du tabagisme

Auteurs : A. Miladi1,  
J. Kooli2 , A. Gara3,  
L. Bouzgarou4

Services : 1 : Circonscription de Moknine; 2 : Service des Soins Hospitalier Régional Ksar Hellal ; 3 : Service de Médecine Préventif EPS Monastir ; 4 : Service de Médecine de Travail Hospitalier Régional Ksar Hellal



Global Events  
& Training Solutions  
www.ipgets.tn

### Introduction :

La lutte contre le tabagisme est l'une des priorités de l'OMS, dont les principaux acteurs sont les professionnels de santé, alors que ces derniers sont loin d'être épargnés du tabagisme.

### Objectif :

Déterminer la relation entre la somme des attitudes, pratiques adéquates et l'association à des connaissances jugées adéquates.

### Méthodes :

Enquête transversale réalisée à l'aide d'un auto questionnaire anonyme durant le mois de mars 2022 incluant 336 personnels.

### Résultats :

Au total, 292 enquêtés avaient rendu le questionnaire rempli dont 91 personnels médicaux. L'âge médian était de 38 ans [31,50]. Le sexe ratio (H/F) était de 0,24.

- Les connaissances parmi le personnel hospitalier étaient jugées adéquates concernant la loi anti-tabac dans 70,1% des cas, concernant le conseil minimal dans 10,6% des cas et concernant la consultation anti-tabac et le traitement nicotinique, respectivement dans 11,3% et 11% des cas.
- Les attitudes étaient jugées adéquates envers la fumée de tabac en milieu hospitalier dans 34,4% des cas avec à la fois une gêne et opposition exprimée. Les personnels de santé attirés par les affiches anti-tabac constituaient 72,4%.
- La pratique la plus partagée parmi le personnel de santé était de donner des conseils envers la communauté dans 44,7%, suivie de pratique des conseils envers des patients dans 27,1% et la participation à des campagnes anti-tabac dans 15,2% des cas.

#### Répartition selon les connaissances, attitudes et pratiques considérées adéquates

	Effectif	Pourcentage (%)
<b>Les connaissances adéquates</b>		
Connaissance de la loi	204	70,1
Connaissance du conseil minimale	31	10,6
Connaissance de la consultation de sevrage tabagique	33	11,3
Connaissance du traitement nicotinique	32	11
<b>Les attitudes adéquates</b>		
Les réactions envers la fumée du tabac (géné et opposé)	98	34,4
Les réactions envers les affiches anti-tabac	210	72,4
<b>Les pratiques adéquates</b>		
La pratique des conseils envers les patients fumeurs (donne à chaque fois)	79	27,1
la pratique des conseils envers la communauté (donne des conseils à l'ensemble des fumeurs)	130	44,7
la Participation dans une journée de sensibilisation	44	15,2

Nous avons défini comme :

- La somme des connaissances adéquates autour du tabac** : le personnel ayant répondu correctement à au moins trois questions relatives aux connaissances juridiques, au conseil minimal, à la consultation ou traitement de sevrage.

- La somme des attitudes adéquates** : le personnel ayant répondu correctement au moins à une question relative aux attitudes relative à la consommation tabagique au sein de l'hôpital ou au faite d'être attiré par les affiches anti-tabac.
- La somme des pratiques adéquates** : le personnel ayant répondu correctement à au moins deux questions relatives aux conseils fournis pour les fumeurs et à la participation aux campagnes de lutte contre le tabac.

Dans cette série, 57,2% des enquêtés partageaient une seule réponse correcte Vs 3,8 % qui avaient les 4 réponses adéquates concernant les connaissances. Concernant les attitudes 72,4% des enquêtés partageaient une seule réponse correcte Vs 0% avaient une association adéquate de 2 attitudes. Concernant les pratiques, 37% des enquêtés partageaient une seule réponse correcte Vs 3,5% avaient une association adéquate de 3 pratique.

#### Répartition selon la somme des connaissance, attitudes et pratiques jugées adéquates

Somme des connaissances		Somme des attitudes		Somme des pratiques	
Somme	Effectif n (%)	Somme	Effectif n (%)	Somme	Effectif n (%)
0	76 (26.2)	0	80 (27.6)	0	115 (39.8)
1	166 (57.2)			1	107 (37)
2	22 (7.6)	1	210 (72.4)	2	57 (19.7)
3	15 (5.2)			3	10 (3.5)
4	11 (3.8)				

Dans cette étude, il était noté une disproportionnalité entre la somme des attitudes, pratiques adéquates et l'association de connaissances jugées comme adéquate (P=0.16).

### Discussion :

Cette étude déclarait que les PS (médicale et paramédicale) étaient malformés en termes de sevrage tabagique ce qui avait un impact sur leurs attitudes et pratiques. Ceci était bien illustré dans une étude analytique menée à Hamad Médicale Corporation et les centres de soins de santé primaires au Qatar en 2019, incluant 7214 personnels de santé qui montrait une relation significative entre les pratiques adéquates et avoir des connaissances adéquates (avec OR à 2,7) et des attitudes positives (avec OR à 1,14) [1].

Dans notre étude ,nous notions l'absence de corrélation entre les connaissances adéquates et les attitudes et pratiques adéquates. Contrairement ,une enquête faite en 2013 au CHU de Monastir, notait une corrélation significative entre ces composants (r=0,13 et p=0,001). La régression de l'application rigoureuse de la loi anti-tabac et le relâchement des politiques de lutte anti-tabac en Tunisie pourraient expliquer ce constat [2].

### Conclusion :

Mettre en place un plan d'action de formation continue du personnel de santé en matière de lutte anti-tabac et les moyens de sevrage semble nécessaire afin qu'ils prennent conscience de leur rôle d'éducateur et de promoteur de santé et de leur devoir d'implication dans cette lutte.

### Références bibliographiques :

- A. AlMulla, «Cross- sectional online survey to determine the prevalence, knowledge, attitude and practice of tobacco cessation among governmental healthcare workers in Qatar,» BMJ Open, 2021.
- I. Laajimi, «connaissances, attitudes et pratiques du personnel de santé vis à vis de la loi antitabac dans le milieu hospitalier,» Monastir, 2014.