

Particularités de l'appendicite aiguë du sujet âgé

Ksibi S, Rguez A, Nasraoui H, Sakhri R

Service de chirurgie générale et digestive CHU Farhat Hached Sousse


Introduction :

L'appendicite aiguë prédomine chez des patients jeunes avec une minorité de cas (5-10%) chez les patients âgés. Cependant, l'incidence de l'AP chez les patients âgés semble être en augmentation nette, liée au vieillissement de la population mais elle reste une affection au diagnostic difficile. Son pronostic demeure réservé. Le but de cette étude a été de décrire les aspects cliniques et thérapeutiques de l'appendicite aiguë du sujet âgé à l'hôpital Farhat Hached Sousse et de dégager les particularités.

Matériels et méthodes :

Nous avons conduit une étude rétrospective descriptive qui a couvert la période allant de 2010 à 2019. Tous les patients âgés de 65 ans et plus, admis durant cette période et chez qui le diagnostic d'appendicite aiguë a été posé, ont été inclus dans l'étude.


Résultats:



Principal motif de consultation: Douleurs abdominales + Vomissements.

Douleur fosse iliaque droite+ défense retrouvées dans 69 cas (86%)

Le principal examen complémentaire réalisé: échographie abdominale. Elle a retrouvé une augmentation des dimensions de l'appendice dans 67 cas . Le délai moyen entre l'hospitalisation et l'intervention était de 90 heures .



L'appendicite était compliquée dans 43 % des cas . Des complications post opératoires ont été notées chez 7,5 % des patients . La durée moyenne d'hospitalisation a été de 4,5 jours . Aucun décès n'a été enregistré.

Conclusion :

La fréquence de l'appendicite aigue chez le sujet âgé connaît une augmentation d'incidence très nette. Cette population présente un risque très accru de complications et de décès postopératoires et devrait faire l'objet d'une prise en charge spécifique et vigilante.