



Poster N°:1085

Titre : La stigmatisation du cancer du sein et les facteurs qui y sont associés chez les survivantes au cancer du sein

Auteurs :

Sonia Doudech*
 Bochra Nouhène Saguem**
 Badra Bannour***
 Rania Bannour ***

Services:

*Hôpital régional d'Enfidha Sousse
 **Psychiatrie, CHU Farhat Hached Sousse
 ***Gynécologie Obstétrique CHU Farhat Hached Sousse



Global Events
 & Training Solutions
 www.ipgets.tn

Introduction: La stigmatisation du cancer du sein est un phénomène invalidant largement répandu dans les sociétés. Elle peut interférer dans l'évolution de la maladie et influer sur la psychopathologie et la qualité de vie des patientes.

Objectifs: Evaluer la stigmatisation du cancer du sein chez des survivantes tunisiennes au cancer du sein et déterminer ses relations avec différents facteurs socio-démographiques, cliniques et psychologiques chez ces patientes.

Méthodes: Il s'agit d'une étude transversale à visée analytique menée auprès de patientes suivies pour un cancer du sein à la consultation externe du service de gynécologie et obstétrique du CHU Farhat Hached de Sousse, ayant eu un traitement chirurgical radical avec une durée minimale de recul de 12 mois. Le recueil des données s'est effectué à partir d'une fiche de renseignements préétablie comportant les données socio-démographiques et cliniques ainsi que les instruments de mesure suivants: l'échelle de stigmatisation du cancer du sein (BCSS), l'index de qualité de sommeil de Pittsburgh (PSQI), l'échelle multidimensionnelle de perception du soutien social (MSPSS), l'échelle d'estime de soi (SESS) et l'échelle d'auto-efficacité perçue (GSES).

Résultats: Cinquante patientes ont été incluses. La population de l'étude présentait un faible niveau de stigmatisation du cancer du sein (score médian BCSS=51,50) (Tableau 1).

Tableau 1: Scores médians du BCSS et de ses sous-échelles

| BCSS | Médianes | Valeur Minimales | Valeurs Maximales |
|--------------------------------------|----------|------------------|-------------------|
| Score total | 51,50 | 23 | 60 |
| Évitement / Perception d'un danger | 8 | 5 | 10 |
| Responsabilité Personnelle | 10 | 4 | 10 |
| Dissimulation | 10 | 2 | 10 |
| Retentissement sur le fonctionnement | 8 | 4 | 10 |
| Intégrité | 8 | 5 | 10 |
| Honte | 10 | 2 | 10 |

Aucun facteur socio-démographique ayant une relation statistiquement significative avec la stigmatisation du cancer du sein n'a été mis en évidence.

Plus le degré de stigmatisation était élevé plus la qualité de sommeil était altérée.

Les scores de responsabilité personnelle et de honte étaient positivement corrélés avec le score MSPSS.

Plus les scores de l'évitement, dissimulation, intégrité et honte étaient élevés plus ceux de l'estime de soi étaient élevés.

Plus les scores des sous-catégories de l'échelle de stigmatisation du cancer du sein, à l'exception de la responsabilité personnelle, étaient élevés, plus le degré d'auto-efficacité perçue était élevé.

Conclusion: Cette étude représente une première étude qui aborde directement le sujet de stigmatisation du cancer du sein en Tunisie. Ses résultats exposent le rôle crucial joué par les facteurs psychologiques dans la stigmatisation du cancer du sein. La qualité de sommeil a également été significativement reliée aux niveaux de stigmatisation ainsi que la qualité du support social.