



Poster N°: 1139

Etude comparative des dimensions de la sexualité chez les femmes diabétiques et non diabétiques

Auteurs :

Meriem Marrakchi,
K. Ounaissa, N. Dhiab,
F. Boukhayatia, A. Ben
Brahim, R. Yahyaoui,
H. Abdelsselem,
C. Amrouche (Pr)

Institut national de
nutrition de Tunis,
TUNISIE



Global Events
& Training Solutions
www.ipgets.tn

Introduction

La sexualité peut inclure plusieurs dimensions telles que les pensées, les fantasmes, les désirs, les croyances.. Mais celles-ci peuvent être influencées par des facteurs biologiques, psychologiques, socio-économiques ou des pathologies somatiques, tel que le diabète.

Le but de notre étude était d'évaluer la sexualité des patientes diabétiques et ses différentes dimensions, ainsi que les facteurs prédictifs de la dysfonction sexuelle féminine (DSF) dans cette population.

Méthodes


Il s'agit d'une étude comparative concernant 30 femmes diabétiques comparées à un groupe témoin de 30 femmes non diabétiques colligées au service de consultations externes de l'institut national de nutrition. La fonction sexuelle a été évaluée par le questionnaire « the Female Sexual Function Index (FSFI) » dont un score inférieur à 26.55 caractérise une DSF.

Nous avons comparé les dimensions de la sexualité selon le questionnaire FSFI Chez les 2 groupes.

Résultats

Âge moyen (en années)	42.97 ± 6.6
Durée du diabète (en années)	12.17 ± 6.2
Comorbidités	
HTA	36.7%
Dyslipidémie	63.3%
Niveau d'instruction supérieur	
Diabétiques	30%
Non diabétiques	45%
Score FSFI moyen	
Diabétiques	25,53 ± 6,11
Non diabétiques	29,75 ± 4,19

Caractéristiques de la population étudiée



Fréquence de la DSF dans la population étudiée

- Le désir sexuel était fortement touché par la durée d'évolution du diabète ($p = 0.016$) ainsi que la parité ($p = 0.02$)
- L'âge avancé des patientes était corrélé à un faible niveau d'excitation sexuelle ($p=0.04$).
- 40% des femmes qui avaient une DSF souhaitaient consulter un sexologue.
- Le niveau d'instruction supérieur a été fortement corrélé à cette demande ($p=0.03$).

Dimensions de la sexualité	Diabétiques	Non diabétiques
Désir	3,78 ± 1,26	4,36 ± 1,23
Excitation	3,88 ± 1,13	4,85 ± 0,83
Lubrification	4,51 ± 1,16	5,06 ± 0,89
Orgasme	4,44 ± 1,24	5,10 ± 0,97
Satisfaction	4,48 ± 1,35	5,52 ± 0,67

Moyenne des scores des différentes dimensions de la sexualité dans les deux groupes

Conclusion

Ces résultats justifient l'impératif du dépistage systématique et de la prise en charge adaptée de la DSF afin d'améliorer la qualité de vie. L'étude de la sexualité s'avère donc nécessaire pour un traitement précoce de ces troubles afin d'éviter les conflits et les mésententes conjugales, sources de stress et de résistance thérapeutique.