



Poster N°: 1184

Cancers de la vésicule biliaire : Aspects épidémiologiques cliniques et thérapeutiques chez les sujets âgés : à propos de 26 cas

Emna Ben ayed,
Fendri.S,Fourati.K,Ben hamed.N, Boujelbene S

Service de chirurgie générale Hôpital Habib Bourguiba Sfax.



Global Events
& Training Solutions
www.ipgets.tn

INTRODUCTION :

Le cancer de la vésicule biliaire est relativement rare. Il se classe au 5ème rang des cancers digestifs.

Il est souvent découvert de façon fortuite sur des pièces de cholécystectomie. Le reste du temps, il n'est symptomatique qu'à un stade avancé.

L'objectif de ce travail est de décrire les aspects épidémiologiques, cliniques et paracliniques, anatomopathologiques et thérapeutiques des cancers de la vésicule biliaire.

MATÉRIEL ET MÉTHODE :

Etude rétrospective portant sur des cas de cancer de la vésicule biliaire, pris en charge au sein du service de chirurgie générale de Sfax, durant une période de 2007 à 2019.

RÉSULTAT :

Un nombre total de 26 patients a été éligible pour notre étude. L'âge moyen de nos patients était de 71.31 ans avec une prédominance féminine 61.5%.

La symptomatologie clinique est dominée par la douleur à type de colique hépatique retrouvée dans 96.2 % des cas.

50% des patients avaient présenté un syndrome de cholestase biologique.

CALCUL VÉSICULAIRE

	Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Ø
Valide NON	5	19.2	19.2	19.2
OUI	21	80.8	80.8	100.0
Total	26	100.0	100.0	

Figures: Aspects à l'échographie

EPAISSISSEMENT PARÉTIAL

	Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Ø
Valide 0	5	19.2	19.2	19.2
EPAISSISSEMENT LOCALISÉ	16	61.5	61.5	80.8
EPAISSISSEMENT DIFFUS	5	19.2	19.2	100.0
Total	26	100.0	100.0	

DILATATION DES VOIES BILIAIRES

	Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Ø
Valide NON	15	57.7	57.7	57.7
OUI	11	42.3	42.3	100.0
Total	26	100.0	100.0	


Sur le plan histologique, les adénocarcinomes représentaient 96.15 % des cas de notre étude.

Les gestes réalisés étaient une bisegmentectomie IVbV chez 50% des patients.

Une cholécystectomie simple a été réalisée chez 20.8% des patients et le reste recevait de gestes palliatifs.

La morbidité opératoire globale était de 43,75%.

Figure 2: Prise en charge



La mortalité globale toutes localisations confondues était de 60.3%.

La moyenne de survie est de 4 mois et demi.

CONCLUSION :

Le cancer de la vésicule est de mauvais pronostic. la chirurgie curative ne peut être proposée que chez la moitié des patients avec des résultats à long terme ne sont pas très satisfaisants.